

Racionāla individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana koronavīrusa slimības (COVID-19) gadījumā

Ieteikumi sagatavoti, nesmot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) pagaidu vadlīnijas un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumus. To mērķis ir sniegt norādes par IAL racionālu lietošanu koronavīrusa slimības (COVID-19) gadījumā.

Ieteikumus veidojis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, balstoties uz:

Pasaules veselības organizācijas (World Health Organization) pagaidu vadlīnijām https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-ICPPPE_use-2020.1-eng.pdf

[https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-\(ncov\)](https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov))

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) pagaidu vadlīnijām <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf>

Balstoties uz pieejamajiem pierādījumiem, COVID-19 infekciju izraisošais koronavīrus galvenokārt izplatās:


- tieši kontaktējoties ar inficētu personu;
- sīku pilienu veidā, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot;
- tieši pieskaroties inficētai personai;
- kā arī netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kam pieskārusies inficētā persona;
- aerogēnā ceļā, veicot riska procedūras pacientiem (piemēram, trahejas intubācija, bronhoskopija, atsūkšana, krēpu indukcija, mehāniskā ventilācija u.c.).

Vislielākais infekcijas risks ir cilvēkiem, kuri ir ciešā kontaktā ar COVID-19 pacientu vai kuri veic COVID-19 pacienta aprūpi.

Veselības aprūpes darbiniekiem, kuri saskaras un veic apstiprinātu vai iespējamu COVID -19 pacientu aprūpi, **obligāti ir jālieto atbilstoši IAL.**

Piemērota IAL izvēle, izvērtējot iedarbības risku un patogēna (piemēram, kontakta, pilienu vai aerosola) pārnešanas iespēju, nodrošina racionālu IAL lietošanu, samazinot IAL pārmērīgu lietošanu.

Nesmot vērā globālo IAL trūkumu, jānosaka pieejamo IAL optimizācijas stratēģiju, kas nodrošinātu un atvieglotu IAL pieejamību (sk.1. attēls.)



Aizsardzībai pret COVID-19 slimības izraisošo koronavīrusu, iesaka lietot šādus IAL (skat. tabulu Nr.1), nosakot atbilstošu IAL savietojamību pamatojoties uz personāla veicamo pasākumu realizēšanu.

Tabula Nr.1 IAL, kas izmantojami saskarsmei ar aizdomu vai apstiprinātu COVID-19 pacientu

Aizsardzība	IAL	Vizualizācija
Elpošanas sistēmas aizsardzība	<u>Respirators ar aizsardzības pakāpi FFP2 vai FFP3 ar vai bez vārsta (vienreizlietojams)</u> <i>Atbilst prasībām:</i> <ul style="list-style-type: none"> EN 149 Direktīva 2016/425 Kategorija III vai līdzvērtīgs 	
	<u>Kirurģiskā maska (vienreizlietojama)</u> <i>Atbilst prasībām:</i> <ul style="list-style-type: none"> ES Direktīvas 93/42 / EEK III kategorija vai līdzvērtīga EN 14683 II tips, IR, IIR 	
	<u>Kirurģiskā maska (vienreizlietojama) – pacientiem</u> <i>Atbilst prasībām:</i> <ul style="list-style-type: none"> EN 14683 jebkura veida, ieskaitot I tipu 	
Acu aizsardzība	<u>Aizsargbrilles (vienreizlietojamas vai daudzreizlietojamas, dezinficējamas)</u> <i>Labs blīvējums ap sejas ādu, elastīgu PVC rāmis, kas viegli pielāgojas visām sejas kontūrām, laba pārrēdzamība, savietojams ar brillēm, ne aizsvīstošs, izturīgs pret skrāpējumiem, ar regulējamu stiprinājumu, lai tā stingri nostiprinātos ap galvu, netieša ventilācija.</i> <i>Atbilst prasībām:</i> <ul style="list-style-type: none"> ES Direktīva 2016/425 EN 166 	
	<u>Sejas ekrāns (vienreizlietojams vai daudzreizlietojams, dezinficējams)</u> <i>Izgatavots no caurspīdīgas plastmasas un nodrošina labu redzamību ar regulējamu stiprinājumu, lai stingri piestiprinātu ap galvu un cieši pieklautos pierei, ir izturīgs pret aizsvīšanu. Pilnībā nosedz seju visā tās garumā.</i> <i>Atbilst prasībām:</i> <ul style="list-style-type: none"> ES Direktīva 2016/425 EN 166 	
Kermēna aizsardzība	<u>Virsvalks/halāts ar garām piedurknēm, ūdens necaurlaidīgs (vienreizlietojams)</u> <i>Atbilst prasībām:</i> <ol style="list-style-type: none"> variants: EN 13795 variants: EN 14126-B; EN 13034 vai EN 14605 vai līdzvērtīgs <ul style="list-style-type: none"> ES Direktīva 2016/425 ES Direktīva 93/42/EEC 	
	<u>Virsvalks/Halāts ar garām piedurknēm, ūdens caurlaidīgs (vienreizlietojams)</u> <i>Medicīniskais halāts no neausta materiāla. Nesterils, minimāla aizsardzība pret šķidrumiem.</i>	
	<u>Ūdensnecaurlaidīgs priekšauts/virsvalks ar piedurknēm (vienreizlietojams)</u> <i>Ūdens necaurlaidīgs,</i> <i>Regulējama kakla siksna (vēlams)</i> <i>Izmērs: 70–90 cm (platums) X 120–150 cm (augstums) vai standarta pieauguša izmērs.</i>	

<p>Kombinezons (vienreizlietojams) <i>Atbilst prasībām :</i> <i>Tips 5 EN ISO 13982-1; Tips 6 EN13034; EN14126</i> <i>Elpojošs</i></p>	
<p>Cimdi ar pagarinātu manšeti (vienreizlietojami) <i>Cimdi - sterili, kīrurgiski, lateks/nitrila, nepūderēti. Manšetes garums vēlams sasniegta apakšdelma vidusdaļu (ne mazāk 280 mm garums)</i> <i>Atbilst prasībām</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ES Direktīva 93/42/EEC Klase I</i> • <i>EN 455</i> <p><i>Cimdi – nesterili, lateks/nitrila, nepūderēti. Manšetes garums vēlams sasniegta apakšdelma vidusdaļu (ne mazāk 280 mm garums)</i> <i>Atbilst prasībām:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ES Direktīva 93/42/EEC Klase I</i> • <i>EN 455</i> • <i>ES Direktīva 89/686/EEC Kategorija III</i> • <i>EN 374</i> 	
<p>Bahilas - garās (vienreizlietojamas) <i>Universāls izmērs, ūdens necaurlaidīgs, mehāniski izturīgs, neslīdoša zole augstums ne mazāks par 30 cm</i></p>	
<p>Kirurgiskā cepurīte (vienreizlietojama)</p>	

Ja ir pieejams, elpcelu aizsardzībai var lietot arī cita veida sejas aizsargmaskas/pusmasas/ ar motorizētu gaisa padeves sistēmu aizsargmaskas ar atbilstošu FFP3 filtru. Lietošana saskaņā ar ražotāja noteikto instrukciju.



IAL ierobežotas pieejamības gadījumā, būtiskākie norādījumi veselības aprūpes darbinieku IAL izvēles noteikšanā un citu pasākumu ieviešanā, kas samazina veselības aprūpes darbiniekiem inficēšanās risku:

- Saziņa, izmantojot telefona sakarus, lai novērtētu iespējamos COVID-19 slimības gadījumus un vieglu saslimšanas gadījumu uzraudzību mājas apstākļos, samazinot šo personu vajadzību doties uz veselības aprūpes iestādēm.
- Stikla vai plastmasas sienu (ekrānu) uzstādīšana, lai samazinātu COVID-19 vīrusa izplatīšanos. Šo pieju var īstenot veselības aprūpes vietās, kur ierodas pacienti, piemēram, reģistrācijas nodalā neatliekamās palīdzības nodalā vai aptiekās.
- Samazināta/izvērtēta veselības aprūpes darbinieku iesaiste pacienta aprūpē. Organizēt procedūru un aprūpes pasākumus apvienojot, lai samazinātu telpā ienākšanas reižu skaitu (piemēram, pārbaudiet dzīvībai svarīgās pazīmes medikamentu ievadišanas laikā, ēdienu piegāde u.c.).
- Atbilstoša/izvērtēta IAL lietošana.
- IAL lietošanas instrukcijas ievērošana – IAL uzvilkšana un novilkšana pareizā secība.
- Stingra roku higiēna pirms un pēc IAL novilkšanas.
- Dezinfekcijas pasākumi.
- Personāla apmācība.

Minimālas prasības IAL prasībām veselības aprūpes darbiniekiem apstiprinātu vai aizdomu gadījumā COVID-19 pacientu aprūpei:

- **respirators FFP2/FFP3** vai ķirurģiskā maska*;
- aizsargbrilles vai sejas ekrāns;
- virsvalks/halāts ar garām piedurknēm no ūdens necaurlaidīga materiāla vai virsvalks/halāts ar garām piedurknēm no ūdens caurlaidīga materiāla ar ūdensnecaurlaidīgu priekšautu vai kombinezons;
- cimdi ar pagarinātu manšeti.

Pirms respiratoru FFP2/FFP3 lietošanas jāpārbauda tā hermētisms un piemērotība sejai.



*respiratoru FFP2/FFP3 trūkuma gadījumā, lieto ķirurģisko masku. Tā galvenokārt aizsargā no izelpotajām pilienu daļiņām. To lietošanu izvērtē, nēmot vērā katru gadījumu atsevišķi.

Ja veselības aprūpes iestādē trūkst visi nepieciešamie IAL, jāveic to rūpīga sadale atbilstoši veicamo pasākumu nodrošināšanai. Ieteikumi norādīti tabulā Nr. 2.

FFP3 respiratori jālieto veselības aprūpes darbiniekiem, kuri atrodas augsta riska zonās (piemēram, intensīvās terapijas nodaļās) un ir iesaistīti tiešā pacientu aprūpē, **veicot aerosolus veidojošas diagnostikas vai ārstniecības procedūras**, kas ir saistītas ar paaugstinātu infekcijas pārnešanas risku un prasa īpašus aizsardzības pasākumus:

- trahejas intubācija, ekstubācija, manuāla ventilācija, atsūkšana;
- traheotomijas /traheostomijas procedūras (ievietošana/atsūkšana/izņemšana);
- bronhoskopija;
- ķirurģiskās manipulācijas, operācijas;
- zobārstniecība (īpaši, urbšana);
- neinvazīvā ventilācija (NIV), piemēram, BiPAP (*Bi level Positive Airway Pressure; [bifāziska spiediena atbalsta ventilācija]*) un CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure ventilation; [spontānās elpošanas režīms ar spiediena atbalstu]*);
- HFOV (*High frequency Oscillating Ventilation; [augstas frekvences atbalsta ventilācija]*);
- HFNO (*High flow Nasal Oxygen; [augstas plūsmas skābekļa terapija]*);
- krēpu atsūkšana.

Uztriepes nēmšanas procedūru var uzskatīt par aerosolu veidojošu procedūru.

Aerosolus veidojošas diagnostikas procedūras gadījumā ārstniecības personālam obligāti jālieto:

- **respirators FFP2/FFP3;**
- **virsvalks/halāts ar garām piedurknēm no ūdens necaurlaidīga materiāla;**
- **cimdi ar pagarinātu manšeti;**
- **aizsargbrilles vai sejas ekrāns.**

Procedūras veic atbilstoši vēdināmā telpā - dabiskā ventilācija ar gaisa plūsmu vismaz 160 l / s vienam pacientam vai negatīvā spiediena telpās ar vismaz 12 gaisa maiņām stundā un kontrolētu gaisa plūsmas virzienu, ja tiek izmantota mehāniskā ventilācija. Šādu procedūru laikā jāierobežo cilvēku skaits telpā; visām klātesošām personām jālieto noteiktie IAL.



Ja tiek veikta vienlaikus vaīrāku pacientu aprūpe ar vienādu diagnozi –COVID-19, personālas drīkst lietot respiratorus, nenonēmot tos. Maksimālais laiks to lietošanai līdz 4 stundām (ja ražotājs nav noteicis savādāku lietošanas laiku). **Nedrīkst respiratoru nonemt visu tā lietošanas laiku. Līdzko tas tiek nonemts, jāveic visu IAL nomaiņa.**

Kirurgiskās maskas lieto:

- skartajās zonās bez tieša pacienta kontakta, piemēram, telpu uzkopšana, aprīkojuma tīrīšana, izrakstīto pacientu palātu tīrīšana utml.).
Šajā gadījumā ķirurgisko sejas masku lieto kombinācijā ar citiem IAL, kas paredzēti telpu uzkopšanas veikšanai.
- tuva kontakta gadījumā ar pacientu (distance 1m), piemēram, nodrošinot pacientu aprūpi, mājas vizītes, veicot attēlu diagnostiku, flebotomijas procedūras, fizioterapija utml.
Šajā gadījumā ķirurgisko sejas masku lieto kombinācijā ar priekšautu, cimdiem un sejas ekrānu/aizsargbrillēm, ja pastāv risks acu kontaminācijai ar pilieniem vai daļiņām.

Personālam, kurš veic telpu apkopi un atkritumu apsaimniekošanu, kas saistīti ar COVID-19 pacientiem, jālieto:

- **ķirurgiskā maska vai respirators FFP2/FFP3*;**
- aizsargbrilles vai sejas ekrāns,
- virsvalks/halāts no ūdens necaurlaidīga materiāla;
- cimdi ar pagarinātu manšeti/ saimniecības gumijas cimdi;
- Ūdens necaurlaidīgi zābaki (gumijas vai cita materiāla)

*Ja ir nepietiekams respiratoru FFP2/FFP3 daudzums, tad ir pieļaujams lietot ķirurgisko masku.

Obligāti jāveic regulāra tīrīšana un dezinfekcija.

Tabula Nr.2 Ieteicamie IAL, kas izmantojami saskarsmei ar aizdomu vai apstiprinātu COVID-19 pacientu, atbilstoši darbības vietai, personālam un darbības veidam

Iestādes telpa	Mērķa personāla vai pacientu noteikšana	Darbības veids	IAL veids vai procedūras
STACIONĀRA TELPAS			
Pacientu palāta	Medicīnas personāls	Tieši nodrošina COVID-19 pacientu veselības aprūpi	Ķirurgiskā maska Halāts Cimdi Aizsargbrilles vai sejas ekrāns
		Aerosolu ģenerējošas procedūras, ko veic COVID-19 pacientiem	Respirators FFP2/FFP3 vai līdzvērtīgs Halāts Cimdi Aizsargbrilles vai sejas ekrāns Priekšauts

	Tīrītāji, uzkopēji	Ieejot COVID-19 pacienta palātā	Ķirurgiskā maska Halāts Biezie uzkopšanas cimdi Aizsargbrilles vai sejas ekrāns Zābakai vai slēgti darba apavi
	Apmeklētāji	Ieejot COVID-19 pacienta palātā	Ķirurgiskā maska Halāts Cimdi
Citas pacienta pārvietošanās zonas (piem., palātas, koridori)	Viss personāls, iesk. medicīnas personālu	Jebkura darbība, kas nav saistīta ar tiešu kontaktu ar COVID-19 pacientu	Nav nepieciešami IAL
Šķirošana	Medicīnas personāls	Sākotnējs skrīnings, kas neparedz tiešu kontaktu ar COVID-19 pacientu	Ievērot distanci ne mazāku kā 1 m Nav nepieciešami IAL
	Pacienti ar respiratoriem simptomiem	Jebkura darbība	Ievērot distanci ne mazāku kā 1 m Pacientam piedāvāt ķirurgisko masku, kas paredzēta pacientiem
	Pacienti bez respiratoriem simptomiem	Jebkura darbība	Nav nepieciešami IAL
Laboratorija	Laboratorijas tehniskie darbinieki	Darbības ar augšējā elpošanas trakta (respiratoriem) paraugiem	Ķirurgiskā maska Halāts Cimdi Aizsargbrilles vai sejas ekrāns
Administrācijas atrašanās zona	Viss personāls, iesk. ārstniecības personas	Administratīvi uzdevumi, kas nav saistīti ar kontaktu ar COVID-19 pacientu	Nav nepieciešami IAL

AMBULATORĀS (KONSULTATĪVĀS) PALĪDZĪBAS TELPAS			
Konsultāciju telpas	Medicīnas personāls	Ārsta apskate pacientiem ar respiratoriem simptomiem	Ķirurgiskā maska Halāts Cimdi Aizsargbrilles vai sejas ekrāns
	Medicīnas personāls	Ārsta apskate pacientiem bez respiratoriem simptomiem	IAL atbilstoši standarta piesardzībai un riska izvērtējumam
	Pacienti ar respiratoriem simptomiem	Jebkura darbība	Pacientam piedāvāt ķirurgisko masku – kas paredzēta pacientiem
	Pacienti bez respiratoriem simptomiem	Jebkura darbība	Nav nepieciešami IAL
	Tīrītāji, uzkopēji	Pēc un starp konsultācijām pacientiem ar respiratoriem simptomiem	Ķirurgiskā maska Halāts Biezie uzkopšanas cimdi Aizsargbrilles vai sejas ekrāns Zābakai vai slēgti darba apavi
Uzgaidāmā telpa	Pacienti ar respiratoriem simptomiem	Jebkura darbība	Pacientam piedāvāt ķirurgisko masku, kas paredzēta pacientiem Tūlitēji pārvietot pacientu uz izolācijas telpu vai atsevišķi no citiem; ja nav iespēju – ievērot distanci vismaz 1 m attālumā no citiem pacientiem
	Pacienti bez respiratoriem simptomiem	Jebkura darbība	Nav nepieciešami IAL
Administrācijas atrašanās zona	Viss personāls, iesk. ārstniecības personas	Administratīvi uzdevumi	Nav nepieciešami IAL
Šķirošana	Medicīnas personāls	Sākotnējs skrīnings, kas neparedz tiešu kontaktu ar COVID-19 pacientu	Ievērot distanci ne mazāku kā 1 m Nav nepieciešami IAL
	Pacienti ar	Jebkura darbība	Ievērot distanci ne mazāku kā 1 m

	respiratoriem simptomiem		Pacientam piedāvāt ķirurgisko masku
	Pacienti bez respiratoriem simptomiem	Jebkura darbība	Nav nepieciešami IAL
SABIEDRĪBA			
Mājas	Pacienti ar respiratoriem simptomiem	Jebkura darbība	Ievērot distanci ne mazāku kā 1 m Pacientam piedāvāt ķirurgisko masku
	Pacienti bez respiratoriem simptomiem	Jebkura darbība	Nav nepieciešami IAL
	Aprūpētāji	Darbojas pacienta istabā, nesniedzot tiešu aprūpi vai palīdzību	Ķirurgiskā maska
	Aprūpētāji	Nodrošina tiešu aprūpi, savācot fēces, urīnu vai COVID-19 pacienta atkritumus mājas aprūpē	Ķirurgiskā maska Cimdi Priekšauts (ja pastāv risks šķakatām)
	Medicīnas personāls	Jebkura darbība	Ķirurgiskā maska Halāts Cimdi Aizsargbrilles vai sejas ekrāns
Sabiedriskas iestādes (piem., skolas, lielveikali, vilcienu stacijas)	Personas bez respiratoriem simptomiem	Jebkura darbība	Nav nepieciešami IAL
ROBEŽŠĶERSOŠANAS VIETAS			
Administratīvā zona	Viss personāls	Jebkura darbība	Nav nepieciešami IAL
Skrīninga zona	Personāls	Sākotnējs skrīnings (temperatūras mērišana) bez tieša kontakta	Ievērot distanci ne mazāku kā 1 m Nav nepieciešami IAL
	Personāls	Atkārtots (sekundārs skrīnings), piem., pasažieru ar temperatūru aptaujāšana par COVID-19 simptomiem, ceļošanas vēsturi)	Ķirurgiskā maska Cimdi
	Tīrītāji, apkopēji	Telpu tīrišana, kurā uzturējušies	Ķirurgiskā maska Halāts Biezie uzkopšanas cimdi Aizsargbrilles vai sejas ekrāns Zābakai vai slēgti darba apavi
Pagaidu izolācijas zona	Personāls	Piekļuve izolācijas zonai, bet nesniedz tiešu palīdzību	Ievērot distanci ne mazāku kā 1 m Ķirurgiskā maska Cimdi
	Personāls, medicīnas personāls	Pavada pasažierus, kurus transportē uz veselības aprūpes iestādēm	Ķirurgiskā maska Halāts Cimdi Aizsargbrilles vai sejas ekrāns
	Tīrītāji, apkopēji	Uzkopj izolācijas zonu	Ķirurgiskā maska Halāts Biezie uzkopšanas cimdi Aizsargbrilles vai sejas ekrāns Zābakai vai slēgti darba apavi
	Medicīnas personāls	Nogādā iespējamo COVID-19 pacientu uz medicīnas iestādi	Ķirurgiskā maska Cimdi Aizsargbrilles vai sejas ekrāns

Ambulance (OMT) vai cits transportlīdzeklis	Auto vadītājs	Tikai vada OMT ar iespējamu COVID-19 pacientu, šoferis nodalīts ar starpsienu no pacienta	Ja attālums vismaz 1m IAL nav nepieciešami
		Palīdz pacientu iecelt/izceļt	Ķirurgiskā maska Halāts/ kombinezons Cimdi Aizsargbrilles vai sejas ekrāns
		Nav tiešā kontaktā ar iespējamo COVID-19 pacientu, bet nav nodalīts ar starpsienu no pacienta	Ķirurgiskā maska
		Pacients ar iespējamu COVID-19 diagnozi	Tiek transportēts uz medicīnas iestādi
		Tīrītāji, apkopēji	OMT tūrišana pēc iespējamā COVID-19 pacienta transportēšanas

EPIDEMIOLOGI

Jebkurā vietā	Epidemiologi	Aptaujā iespējami pozitīvu vai apstiprinātu COVID-19 pacientu vai viņa kontaktus	Nav nepieciešami IAL, ja aptaujā attālināti (piem., telefoniski vai video konference)
		Veic iespējami pozitīva vai apstiprināta COVID-19 pacienta aptauju klātienē bez tieša kontakta	Ķirurgiskā maska Ievērot distanci ne mazāku kā 1 m Pacientam piedāvā ķirurgisko masku
		Veic COVID-19 pacienta asimptomātisku kontaktpersonu aptauju klātienē	Ievērot distanci ne mazāku kā 1 m Nav nepieciešami IAL Ja ir nepieciešams aptaujāt iekštelpās, ar termālo kamерu pārliecinās, ka personai nav paaugstināta kermēna temperatūra, ievēro vismaz 1 m distanci un neskaras klāt priekšmetiem iekštelpās.